

# Bulletin Agrométéorologique Décadaire

N°36

Période du 21 au 31 décembre 2023



## SOMMAIRE


- baisse des températures extrêmes de l'air sous abri comparativement à la normale 1991-2020 sur l'ensemble du pays ;
- hausse de l'humidités relative minimale de l'air sous abri et baisse de la maximale par rapport à la normale 1991-2020, sur la majeure partie du territoire ;
- hausse de l'évapotranspiration potentielle (ETP) et baisse de l'évaporation du bac classe « A » comparativement à la normale 1991-2020 sur la majeure du pays ;
- besoins en eau d'irrigation pour quelques cultures de saison-sèche ;
- prévision sur l'évolution de l'etp climatique et de l'évolution du temps pour la prochaine décade ;
- suivi de l'évolution de la végétation par satellite.

## I. Situation climatologique

*La troisième décade de décembre 2023 a été marquée par la présence d'une activité modérée des vents d'harmattan sur la majeure partie du pays. Les températures maximales de l'air sous abri ont varié entre 31,9 °C à Gorom-Gorom et 36,6 °C à Sidéradouguou, tandis que les minimales ont oscillé entre 9,5 °C à Farakoba et 19,9 °C à Legmoïn. Les humidités relatives extrêmes de l'air sous abri ont évolué de 23 % à Bousse à 84 % à Mangodara pour les maximales et entre 9 % à Bogandé et 18 % à Niangoloko pour les minimales. L'évapotranspiration potentielle (ETP) a oscillé entre 54 mm à Boromo et 74 mm à Bobo-Dioulasso. L'évaporation bac classe « A » a varié entre 53 mm à la Vallée du Kou et 119 mm à Bogandé.*

### I.1. Evolution de la température

La troisième décade du mois de décembre 2023 a été caractérisée par une évolution des températures maximales sous abri comprise entre 31,9 °C à Gorom-Gorom dans la province de l'Oudalan et 36,6 °C à Sidéradouguou dans la Comoé (fig. a). Comparativement à la normale (moyenne 1991-2020), pour la même période, elles ont été en hausse sur la majeure partie du territoire. Néanmoins, une baisse de ce paramètre a été enregistrée dans certaines localités des régions du Sahel, du Centre-Nord, de l'Est et de la Boucle du Mouhoun (fig. b).




Les températures minimales de l'air sous abri ont varié entre 9,5 °C à Farakoba dans la province du Houet à 19,9 °C à Legmoïn dans le Nounbiel (fig. c). Par rapport à la normale

(moyenne 1991-2020) pour la même période, elles ont été en baisse sur la majeure partie du territoire national. Cependant, une légère hausse de ce paramètre a été constatée dans quelques localités des régions du Sahel, de l'Est et de la Boucle du Mouhoun (fig. d).

## I.2. L'humidité relative de l'air

Au cours cette décade, l'humidité relative maximale de l'air sous abri a évolué entre 23 % à Boussé dans la province du Kourwéogo et 84 % à Mangodara dans la Comoé (fig. e). Comparativement à la normale (moyenne 1991-2020), elle a été en hausse sur la majeure partie du pays. Néanmoins, dans certaines localités des régions du Sahel, du Centre-Nord, de l'Est, du Centre-Est, du Plateau-Central et de la Boucle du Mouhoun, une baisse de ce paramètre a été enregistrée (fig. f).



Quant à l'humidité relative minimale sous abri, elle s'est située entre 9 % à Bogandé dans la Gnagna et 18 % à Niangoloko dans la Comoé (fig. g). Relativement à la normale (moyenne 1991-2020), elle a été en baisse sur la majeure partie du territoire. Cependant dans

certaines localités des régions du Nord, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest, une hausse de ce paramètre a été observée (fig. h).

## **Conseils pratiques**

Au regard de l'évolution des températures moyennes minimales et maximales et des taux d'humidité relative de l'air qui demeurent relativement élevés comparativement à la moyenne surtout sur la partie ouest du pays, il est conseillé de poursuivre le séchage des produits de récolte pour réduire au maximum les pertes post récolte dues à certains déprédateurs.

Accélérer la mise en place des cultures maraîchères et des cultures de saison sèche pour permettre à celles-ci de boucler convenablement leur cycle.

Par rapport aux cultures pluviales, les cultures maraîchères ont des besoins spécifiques en eau et en température. Lorsque ces exigences ne sont pas remplies, les plants ont des difficultés de production ou la production est de mauvaise qualité. Compte tenu de ces contraintes, le choix de l'époque de cultures maraîchères est particulièrement déterminant. Le tableau suivant nous donne les exigences en eau et températures de quelques cultures maraîchères.

**Tableau I : exigence de quelques cultures maraîchères**

Cultures maraîchères	Besoins en eau	Températures favorables	
		20 - 30 °	30 - 40°
Pomme de terre	650 mm	++	+
Haricot vert	250 - 300mm	++	-
Tomate	700 - 750mm	++	+
Oignon	450 - 500 mm	++	+
Choux	650 mm	++	+
Carotte	400 - 500 mm	++	-

*Source : DUPRIEZ H 1987*

**Légende** : ++ : très favorable ; + : favorable ; - : défavorable

Ce tableau permet de voir qu'en dehors du haricot vert, toutes les autres cultures ont des besoins élevés en eau et préfèrent des températures douces pour leur croissance.

- **Attention!** Les températures extrêmes enregistrées dans les bas-fonds en cette période sont généralement inférieures de 1 à 2 °C à celles observées dans les stations.
- Il faut noter que la température optimale de croissance pour la plupart des variétés de **tomate** se situe entre 21 et 24 °C. Ces plantes peuvent supporter un certain intervalle de température, mais en dessous de 10 °C et au-dessus de 38 °C, les tissus des plantes seront endommagés. Leur température optimale de germination se situe entre 16 et 29 °C.
- L'avènement de températures extrêmes en cette période pourrait avoir aussi un effet néfaste sur la floraison, la pollinisation et la fructification des tomates et des poivrons. En effet, chez la tomate :
  - ❖ Une température supérieure à 35 °C entraîne une mise à fruit réduite ;
  - ❖ De 18.5 °C à 26.5 °C, on a une température optimale pour la mise à fruit ;
  - ❖ Par contre, une température inférieure à 13 °C occasionne le manque ou l'altération de la floraison.
- Pour ce qui concerne les poivrons :
  - ❖ Une température supérieure à 32 °C le jour entraîne une stérilité du pollen et une chute des fleurs ;
  - ❖ La température optimale pour la mise à fruits est de 16 °C ;
  - ❖ Par contre en dessous de 15.5 °C, on a une mise à fruits médiocre.
- ✚ **Le maïs** est très apte pour les températures de 20 à 25 °C, inapte aux températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 40 °C.
- ✚ La température des tubercules dans le sol pour **la pomme de terre**, idéalement, doit être inférieure à 15 °C.
- ✚ La température optimale de germination de **l'oignon** est de 18 °C.

Au regard de l'évolution des paramètres météorologiques ci-dessus, il est important de noter à l'endroit des producteurs que le **mildiou**, la plus redoutée et la plus célèbre des maladies de la tomate et de la pomme de terre se développe :

- ❖ lorsque l'atmosphère est humide (système d'irrigation par aspersion mise à contribution) et que les températures sont douces à fraîches (comprises entre 17 et 27 °C) ;
- ❖ qu'il se propage par le vent et s'agrippe aux feuilles mouillées. Aussi les pieds de tomates doivent être suffisamment espacés et aérés, afin de garder les feuilles les plus sèches, possible. Dans la mesure du possible, orienter les rangs parallèlement aux

vents dominants afin de favoriser une meilleure circulation de l'air propice à l'assèchement du feuillage ;

- ❖ qu'il peut survivre plusieurs années dans le sol ;
- ❖ éviter d'arroser les plants le soir pour éviter que les feuilles restent humides toute la nuit ;
- ❖ installer un système d'arrosage goutte à goutte.

### I.3. L'évaporation de l'eau


#### I.3.1 Situation de la décade

À la troisième décade du mois de décembre 2023, l'évapotranspiration potentielle (ETP) a oscillé entre 54 mm à Boromo dans la province des Balé et 74 mm à Bobo-Dioulasso dans la province du Houet (fig. i). Relativement à la série 1991-2020 pour la même période, l'ETP a connu une hausse sur l'ensemble du pays (fig. j).

Quant à l'évaporation relevée dans le Bac classe « A », elle a été comprise entre 53 mm à la Vallée du Kou dans le Houet et 119 mm à Bogandé dans la Gnagna (fig. k). Comparativement à la normale (moyenne 1991-2020), elle a été en baisse sur la quasi-totalité du pays. Cependant dans certaines localités de la région de l'Est, une légère hausse de ce paramètre a été enregistrée (fig. l).

Au regard de l'évolution des paramètres météorologiques ci-dessus analysés, nous conseillons aux producteurs d'observer les conditions optimales de pulvérisation des produits phytosanitaires qui sont les suivantes :

- ✚ une hygrométrie comprise entre 60 % et 95 % ;
- ✚ une vitesse de vent inférieure à 8 km/h (2.2 m/s) ;
- ✚ une température inférieure à 21 °C ;
- **La pulvérisation de produits phytosanitaires à la température adéquate permet d'éviter leur évaporation ;**
- **Privilégier les pulvérisations en début ou en fin de journée qui sont des périodes pendant lesquelles le vent est calme et les températures sont basses ;**
- **Traiter avec une hygrométrie élevée (supérieure à 60 %) notamment lors de la mise en œuvre de produits systémiques appliqués sur le feuillage de préférence le matin ou le soir.**



- **Conseils** : compte tenu de la faible disponibilité des ressources en eau et évoluant dans un contexte de changement climatique, il est conseillé aux producteurs qui ont les moyens de songer à l'implantation des systèmes d'irrigation goutte à goutte. Cette technologie permet d'économiser l'eau à travers des goutteurs qui livrent l'eau à petite dose au pied de la culture mais sur un temps étalé.
- L'utilisation de résidus de récoltes pour le paillage du sol et la fumure organique est aussi fortement recommandée.

### I.3.2 Situation climatologique de l'évapotranspiration et de l'évaporation « bac »

**Tableau II** : Cumuls des valeurs de l'ETP et de l'évaporation Bac classe « A » du 1<sup>er</sup> Décembre au 31 Mars (normales 1991-2020)

stations	ETP (mm)	BAC (mm)
Bobo-Dioulasso	802,2	1272,8
Bogande	774,6	1516,2
Boromo	617,7	1140,1
Dedougou	814,1	1462,1
Dori	586,0	1045,9
Fada N'Gourma	693,0	1181,9
Gaoua	659,4	1066,6
Ouagadougou	762,2	1112,7
Ouahigouya	707,3	1305,7
Po	704,2	1212,0

### I.3.3 Besoins en eau d'irrigation

#### a. Coefficients culturaux de quelques cultures de saison sèche

Culture: Maïs Cycle: 125 jours Besoin en eau: 500 à 800 mm/ cycle

Stade de développement	G-DM (20 jrs)			M-AS (35 jrs)			DE-SGP (40 jrs)					MCG (30 jrs)		
Décade après semis/plantation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Coefficients culturaux	0.3	0.3	0.32	0.54	0.77	1	1.18	1.2	1.2	1.2	1.17	0.98	0.72	0.55

G : Germination AS : Apparition des Soies MCG : Maturité Complète des Grains  
DM : Début Montaison DE : Développement de l'Epi  
M : Montaison SGP : Stades Grain Pateux

Culture: Tomate Cycle: 135 jours Besoin en eau: 400 à 800 mm/cycle

Stade de développement	P - DC (30 jrs)			PC-DF (40 jrs)				DF-GF (40 jrs)				MF (25 jrs)		
Décade après semis/plantation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Coefficients culturaux	0.6	0.6	0.6	0.68	0.8	0.95	1.10	1.15	1.15	1.15	1.15	1.12	1.03	0.90

P : Plantation DF : Début Floraison

Culture: Oignon Cycle: 95 jours Besoin en eau: 350 à 550 mm/cycle

Stade de développement	G-B (20 jrs)		DDF (45 jrs)					FB (20 jrs)		MB (10 jrs)	
Décade après semis/plantation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Coefficients culturaux	0.7	0.7	0.77	0.89	1	1.05	1	1	1.05	1.01	0.96

G : Germination B : Bourgeonnement DDF : Développement des Feuilles  
FB : Formation de la Bulbe MB : Maturation de la bulbe

#### b. Evaluation des besoins en eau (en mm) maximaux (ETM) de quelques cultures de campagne sèche.

#### Tableaux III : besoins en eau de quelques cultures

culture: Maïs		Cycle: 125 jours												
Stations	Décades	ETM (mm/décade) à partir du 1er jour après sémis												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bobo Dioulasso		18.0	18.0	19.2	32.4	46.1	59.9	71.9	71.9	71.9	70.1	58.7	43.1	33.0
Bogande		16.9	16.9	18.0	30.3	43.3	56.2	67.4	67.4	67.4	65.7	55.1	40.5	30.9
Boromo		13.1	13.1	14.0	23.6	33.7	43.7	52.5	52.5	52.5	51.1	42.8	31.5	24.0
Dédougou		18.0	18.0	19.2	32.4	46.2	60.0	72.0	72.0	72.0	70.2	58.8	43.2	33.0
Dori		12.5	12.5	13.3	22.5	32.1	41.6	50.0	50.0	50.0	48.7	40.8	30.0	22.9
Fada N'gourma		15.1	15.1	16.2	27.3	38.9	50.5	60.6	60.6	60.6	59.1	49.5	36.3	27.8
Gaoua		14.2	14.2	15.1	25.5	36.3	47.2	56.6	56.6	56.6	55.2	46.2	34.0	25.9
Ouagadougou		16.8	16.8	17.9	30.2	43.1	55.9	67.1	67.1	67.1	65.4	54.8	40.3	30.8
Ouahigouya		15.1	15.1	16.1	27.2	38.9	50.5	60.6	60.6	60.6	59.0	49.5	36.3	27.8
Pô		15.6	15.6	16.6	28.1	40.1	52.0	62.4	62.4	62.4	60.9	51.0	37.5	28.6

ETM = Kc\* ETo : Besoins en eau maximaux de la culture

culture: Tomate		Cycle: 135 jours													
Stations	Décades	ETM (mm/décade) à partir du 1er jour après plantation													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bobo Dioulasso		36.0	36.0	36.0	40.8	47.9	56.9	65.9	68.9	68.9	68.9	68.9	67.1	61.7	53.9
Bogande		33.7	33.7	33.7	38.2	45.0	53.4	61.8	64.6	64.6	64.6	64.6	62.9	57.9	50.6
Boromo		26.2	26.2	26.2	29.7	35.0	41.5	48.1	50.3	50.3	50.3	50.3	49.0	45.0	39.3
Dédougou		36.0	36.0	36.0	40.8	48.0	57.0	66.0	69.0	69.0	69.0	69.0	67.2	61.8	54.0
Dori		25.0	25.0	25.0	28.3	33.3	39.6	45.8	47.9	47.9	47.9	47.9	46.6	42.9	37.5
Fada N'gourma		30.3	30.3	30.3	34.3	40.4	48.0	55.5	58.1	58.1	58.1	58.1	56.5	52.0	45.4
Gaoua		28.3	28.3	28.3	32.1	37.7	44.8	51.9	54.2	54.2	54.2	54.2	52.8	48.6	42.5
Ouagadougou		33.6	33.6	33.6	38.0	44.8	53.1	61.5	64.3	64.3	64.3	64.3	62.7	57.6	50.3
Ouahigouya		30.3	30.3	30.3	34.3	40.4	47.9	55.5	58.0	58.0	58.0	58.0	56.5	52.0	45.4
Pô		31.2	31.2	31.2	35.4	41.6	49.4	57.2	59.8	59.8	59.8	59.8	58.3	53.6	46.8

ETM = Kc\* ETo : Besoins en eau maximaux de la culture

culture: Oignon		Cycle: 95 jours									
Stations	Décades	ETM (mm/décade) à partir du 1er jour après sémis									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bobo Dioulasso		42.0	42.0	46.1	53.3	59.9	62.9	62.9	62.9	60.5	57.5
Bogande		39.3	39.3	43.3	50.0	56.2	59.0	59.0	59.0	56.8	53.9
Boromo		30.6	30.6	33.7	38.9	43.7	45.9	45.9	45.9	44.1	42.0
Dédougou		42.0	42.0	46.2	53.4	60.0	63.0	63.0	63.0	60.6	57.6
Dori		29.1	29.1	32.1	37.1	41.6	43.7	43.7	43.7	42.1	40.0
Fada N'gourma		35.3	35.3	38.9	44.9	50.5	53.0	53.0	53.0	51.0	48.5
Gaoua		33.0	33.0	36.3	42.0	47.2	49.5	49.5	49.5	47.6	45.3
Ouagadougou		39.2	39.2	43.1	49.8	55.9	58.7	58.7	58.7	56.5	53.7
Ouahigouya		35.3	35.3	38.9	44.9	50.5	53.0	53.0	53.0	51.0	48.4
Pô		36.4	36.4	40.1	46.3	52.0	54.6	54.6	54.6	52.5	49.9

ETM = Kc\* ETo : Besoins en eau maximaux de la culture

**NB : les tableaux ci-dessus représentent les besoins en eau climatiques de chaque culture pour la première décennie du mois de janvier 2024 en fonction du stade dans lequel se trouve la culture.**

*Pour toute irrigation, tenir compte des caractéristiques des différents types de sols en présence*

**Conseils-applications :**

- ✚ **Disposer du fumier qui est bien décomposé et qui n'est pas trop collant, ni trop humide ; il ne doit pas être trop sec non plus, car il peut s'avérer difficile de réhumidifier le fumier**
- ✚ **Mettre en place des brise-vents pour réduire l'assèchement des aménagements**
- ✚ **Espacer et adapter les quantités d'eau selon l'infiltration**
- ✚ **Optimiser l'arrosage :**
  - ✓ Biner, si possible, avant d'arroser ;
  - ✓ Arroser tôt le matin, ou en fin d'après-midi ;
  - ✓ Arroser au niveau des racines lorsque le sol est sec ;
  - ✓ Utiliser, en fonction des plantations, des techniques d'économie d'eau : « goutte à goutte », tuyaux poreux, paillages, etc.

**Avantages du compost et du fumier**

Ils améliorent la fertilité et la structure du sol et réduisent la nécessité d'appliquer du phosphore (P), de l'azote (N) et du potassium (K). Ils fournissent une diversité d'éléments nutritifs à la culture et peuvent être préparés en 21/2 à 3 mois.


#### **I.4. Suivi de la végétation**

##### **Indice de végétation**

Le suivi de la végétation se base sur l'indice de végétation (NDVI-Normalized Difference Vegetation Index) à partir des données de télédétection. Cet indice de végétation exprime l'activité chlorophyllienne des végétaux et constitue ainsi une mesure de la quantité et de la vitalité de la végétation présente sur le sol dans une zone donnée. À la troisième décennie du mois de décembre 2023, la végétation présente une bonne physionomie sur la majeure partie du pays excepté la zone sahélienne où l'on note une dégradation de la couverture végétative (fig. Ma).

Par rapport à la médiane historique (2012-2021), il est observé des conditions de croissances végétatives en retard sur la majeure partie du territoire. Cependant, des avancées de croissance

végétative sont observés dans certaines localités des régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest (fig. Mb).



## I.5 Perspectives pour la première décennie du mois de janvier 2024

### 1.5.1 Prévision climatologique de l'ETP

Il est attendu au cours de la première décennie du mois de janvier 2024 que la demande climatique connaîtra une baisse sur l'ensemble du pays par rapport à la précédente décennie. Elle pourrait évoluer entre 42 mm à Dori et 60 mm à Dédougou (figure o).





Figure o : Prévision climatologique de l'ETP à la première décennie de janvier 2024

### 1.5.2 Prévision du temps pour la période du 03 au 09 janvier 2024

Au cours de la semaine du 03 au 09 Janvier, des vents d'harmattan faibles à modérés souffleront sur l'ensemble du territoire. Le ciel sera en général dégagé avec toutefois des

passages nuageux par moments. Les visibilitées seront légèrement affectées par la poussière en suspension sur la région de l'Est ainsi que sur certaines grandes villes surtout aux heures crépusculaires. **Les températures minimales et maximales seront en hausse et la fraîcheur sera moins ressentie par rapport à la période précédente.** Les températures minimales oscilleront en moyenne entre **18 °C** et **23 °C** tandis que les maximales moyennes varieront entre **34 °C** et **39 °C** (figures p et q).



**Conseils-applications :**

- ✓ Au regard des conditions météorologiques prévues pour les jours prochains, il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires pour se protéger contre la poussière afin d'éviter son inhalation. Si non, ceci pourrait occasionner les irritations de la peau et des yeux, la conjonctivite et les infections oculaires. Certaines maladies infectieuses sont transmises par la poussière.
- ✓ La poussière a aussi de nombreux effets néfastes sur les cultures car elle diminue les rendements en enfouissant les semis et les plantules, provoque une perte de tissu végétal, ralentit la photosynthèse et accentue l'érosion des sols. Il faudrait donc arroser les plants afin de les débarrasser des dépôts de poussières.
- ✓ Parmi les effets indirects des dépôts figurent aussi le colmatage des canaux d'irrigation, le recouvrement des voies de transport et la détérioration de la qualité de l'eau des barrages.
- ✓ La poussière a aussi une incidence sur la production des centrales solaires, en particulier sur les installations qui doivent recevoir un rayonnement direct. Les exploitants doivent veiller à ce que les particules ne s'accumulent pas sur les panneaux.